ANB-00-jjmmdd

Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – Europees te beschermen habitat 9120: Atlantische zuurminnende beukenbossen met Hulst en soms ook Taxus in de ondergroei

AGENTSCHAP
NATUUR & BOS

datum opname | naam opnemer

1. Identificatiegegevens beheereenheid

naam natuurbeheerplan of terrein wippelgem

nr beheereenheid V_1_1

2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling

sleutelsoorten in de kruidlaag	☐ Adelaarsvaren, ☒ Bosanemoon, ☐ Bosgierstgras, ☐ Dalkruid, ☐ Dubbelloof, ☒ Gewone salomonszegel, ☐ Grote veldbies, ☐ Lelietje-van-dalen, ☐ Pilzegge, ☐ Ruige veldbies, ☐ Valse salie, ☐ Wilde kamperfoelie, ☐ Witte klaverzuring	relatieve bedekking (*): ☒ ☹ <30% ☐ ☺ ≥30% aantal soorten: ☒ ☹ <7 ☐ ☺ ≥7 (*) % sleutelsoorten binnen totale bedekking van de kruidlaag
sleutelsoorten in de struik- en boomlaag	☐ Beuk, ☒ Gewone esdoorn, ☐ Haagbeuk, ☐ Hazelaar, ☒ Hulst, ☐ Ruwe berk, ☐ Sporkehout, ☐ Wilde lijsterbes, ☐ Wintereik, ☐ Wintereik x Zomereik, ☒ Zomereik	aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: ☒ ☹ <70% ☐ ☺ ≥70% ☐ ☺☺ ≥90% EN meerdere soorten ≥10%

3. Structuurkenmerken

natuurlijke mozaïekstructuur	grootte & invulling van vlekken met verschillende groeiklassen	☐ ☹ gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken van 1 ha of groter) ☐ ☺ mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha ☐ ☺☺ ingrepen op kleine schaal (< 0.3 ha) ☒ ☺☺ ongelijkjarig en gemengd (verschillende groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd)
fenologie: groeiklassen	☐ 1. open plek (diameter minstens 1 x dominante boomhoogte) ☒ 2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) ☒ 3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek $C_{1.5}$ < 20 cm) ☒ 4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek $C_{1.5}$ 20-60 cm) ☒ 5. middelmatig dik hout (omtrek $C_{1.5}$ 60-120 cm) ☐ 6. dik hout (omtrek $C_{1.5}$ 120-240 cm) ☐ 7. zeer dik hout (omtrek $C_{1.5}$ > 240 cm)	☒ ☺ klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig ☐ ☺☺ klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig

4. Verstoringsindicatoren

verruiging	Gewone braam, Brede stekelvaren, Gewone vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, IJle zegge, Kleefkruid, Pitrus, Waterpeper en Witbol samen	☐ ☺☺ ≤30%	☒ ☺ 30-50%	☐ ☹ >50%
	Gewone braam	☒ ☺☺ ≤30%	☐ ☺ 30-50%	☐ ☹ >50%
	Brede stekelvaren en witbol samen	☒ ☺ ≤10%	☐ ☹ >10%	
	Waterpeper, pitrus en ijle zegge samen	☒ ☺ ≤10%	☐ ☹ >10%	
	Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en kleefkruid samen	☒ ☺ ≤10%	☐ ☹ >10%	
	Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid, Water-peper, pitrus en ijle zegge, elk apart	☐ ☺☺ ≤ 1%	☒ anders	
Invasieve exoten in de kruidlaag	Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Sachalinese en Boheemse), Rimpelroos, Bonte gele dovenetel, Schijnaardbei, Spirea (Douglaspluim-, Bastaard-)	☒ ☺☺ 0%	☐ ☺ ≤1%	☐ ☹ >1%
Invasieve en bodemdegraderen-de soorten in de boom- en struiklaag	Hemelboom, Vlinderstruik, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, Robinia, Rododendron (G), uitheems naaldhout	☐ ☺☺ ≤1%	☐ ☺ 1-10%	☒ ☹ >10%