

Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – Europees te beschermen habitat 91E0, subtype mesotroof broekbos op minder voedselrijke standplaatsen(91E0_vm)

AGENTSCHAP
NATUUR & BOS

datum opname

naam opnemer

13/07/2020

Sophie Dommershausen

1. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid

naam natuurbeheerplan of terrein Jagersborg tot Bergerven nr inventarisatie-eenheid JBto_IV11

2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling

sleutelsoorten in de kruidlaag	☐ Bitterzoet, ☐ Blauw glidkruid, ☐ Dotterbloem, ☐ Elzenzegge, ☐ Gele lis, ☒ Grote wederik, ☐ Hoge cyperzegge, ☐ Kamvaren, ☒ Moerasvaren, ☒ Moeraswalstro, ☒ Pluimzegge, ☐ Slangenwortel, ☐ Stijve zegge, ☒ Wolfspoot	relatieve bedekking (*): ☒ <30% ☐ ≥30% aantal soorten: ☒ <7 ☐ ≥7 (*) % sleutelsoorten binnen totale bedekking van de kruidlaag
sleutelsoorten in de struik- en boomlaag	☐ Es, ☐ Geoorde wilg, ☒ Grauwe wilg (inclusief kruisingen), ☒ Ruwe berk, ☒ Sporkehout, ☒ Wilde lijsterbes, ☒ Zachte berk, ☐ Zwarte bes, ☒ Zwarte els	aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: ☒ <70% ☐ 70 - 90% ☐ ≥90%

3. Structuurkenmerken

natuurlijke mozaïekstructuur	grootte & invulling van vlekken met verschillende groeiklassen	☐ gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken van 1 ha of groter) ☐ mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha ☒ ongelijkjarig en gemengd (verschillende groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd)
fenologie: groeiklassen	☐ 1. open plek (diameter minstens 1 x dominante boomhoogte) ☒ 2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) ☒ 3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C _{1.5} < 20 cm) ☒ 4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C _{1.5} 20-60 cm) ☒ 5. middelmatig dik hout (omtrek C _{1.5} 60-120 cm) ☒ 6. dik hout (omtrek C _{1.5} 120-240 cm) ☐ 7. zeer dik hout (omtrek C _{1.5} > 240 cm)	☒ klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig ☐ klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig

4. Verstoringsindicatoren

verruiging	Gewone Braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid, Pitrus, Waterpeper, samen	☐ ≤30% ☒ >30%
	Gewone braam	☐ ≤10% ☒ >10%
	Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en Kleefkruid samen	☒ ≤30% ☐ >30%
	Gewone braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en Kleefkruid samen	☐ ≤10%
	Waterpeper en pitrus	samen: ☒ ≤10 ☐ >10% elk apart: ☐ ≤1% ☒ anders
Invasieve exoten in de kruidlaag	Reuzenbereklaauw, Duizendknoop (Japanse, Boheemse, Sachalinese, Balsemien (Reuzen-, Oranje- en Tweekleurige) Gele maskerbloem	☒ 0% ☐ ≤1% ☐ >1%
Invasieve en bodemdegraderen de soorten in de boom- en struiklaag	Hemelboom, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, uitheems naaldhout	☐ ≤1% ☒ 1-10% ☐ >10%